

Patientinformation

Opløsning af ikke-permanent filler med hyaluronidase

Hvad er hyaluronidase?

Hyaluronidase (hyalase) er et lægemiddel, der ved injektion kan opløse hyaluronsyre holdige ikke-permanente fillers. Oftest ser man læber, der er overfyldte med skævheder, buler eller at filleren er migreret og ligger i den hvide del af overlæben. Dette skyldes som regel en kombination af for meget og forkert placering af produktet, men kan også opstå efter flere års brug af filler, selv med korrekt produkt og injektionsteknik. Af og til vurderer vi, at det er nødvendigt at opløse et behandlet område for at kunne opnå et ønsket resultat.

Vi behandler også dig, der har problemer med hævelse under øjnene efter filler behandling eller blot er ked af dit look efter filler behandling i fx. hage, kæbe og kindben.

Hyalase virker på alle typer hyaluronsyre holdige fillers og virker ved at accelerere absorptionen af hyaluronsyren i filleren, hvorved den nedbrydes. Nogle gange er det nødvendigt at gentage behandlingen med hyalase.

De fleste vil se en hurtig respons og størstedelen af hyaluronsyren er opløst allerede efter 30 min, dog kan det tage nogen dage før virkningen er aftaget. De fleste vil opleve hurtig effekt. Allerede inden for 4-48 timer. Men for nogen kan det kræve flere behandlinger, før man kan se en synlig forbedring.

Vi anbefaler, at du venter 1 måned med at få filler behandling i området igen.

Før behandlingen

Inden behandling skal du til konsultation hos klinikens kosmetiske sygeplejerske. Behandlingen kan udføres samme dag som konsultationen. Konsultationen er gratis og uforpligtende. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med og du skal afsætte ca. 30 min til konsultationen. Under konsultationen vil I diskutere dine forventninger og muligheder samt besvare eventuelle spørgsmål eller bekymringer.

Før behandlingen tages der billeder af behandlingsområdet. Billederne opbevares sammen med det øvrige journalmateriale fortroligt. Huden skal være intakt så infektioner undgås. Huden skal være helt ren og fri fra make-up. 30 min. Inden behandling bliver huden påført et lag bedøvelsescreme, da behandlingen ikke er smertefri.

Efter behandlingen

- Undgå at røre de behandlede områder i 6 timer og brug ikke makeup samme dag.
- Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre (f.eks. Kodimagnyl, Hjertemagnyl eller Treo), har du større tendens til blå mærker.
- Det anbefales at holde pause med fiskeolie et par dage før og efter behandlingen.
- Hvis du tidligere har haft et forkølelsessår, er der en risiko for, at behandlingen kan fremprovokere et nyt udbrud. Der anbefales tbl. Valaciclovir, som fås på recept hos egen læge.
- På behandlingsdagen skal du undgå at plukke hår i det område, hvor behandlingen udføres.

Bivirkninger

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på indsprøjtningen ved at være let til moderat hævet, rød og øm. Disse reaktioner forsvinder løbende, typisk i løbet af et par dage og i de fleste tilfælde indenfor 1 uge. Læberne hæver ofte mest. Blålig misfarvning kan forekomme.

Dybere blødninger ses sjældent. Infektion kan forekomme i sjældne tilfælde. Ved tegn på infektion i form af rødme, hævelse, ømhed og evt feber skal klinikken kontaktes, da antibiotikabehandling kan være nødvendig for at mindske risikoen for blivende ar. Man må dog ikke have allergi overfor hyalase, hvepse og bier.

I sjældne tilfælde kan der opstå en rødme eller hævelser i huden, specielt under øjet, der kan vare i mdr/år.

Forsigtighedsregler

Der bør udvises forsigtighed med at behandle hvis der er infektion ved indstiksstederne eller allergi overfor produktet og ved visse sygdomme der påvirker immunsystemet. Ved graviditet og amning behandles ikke.

Opstår der noget AKUT, er telefonen altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid på tlf.: 28345288

Revideret april 2025 af speciallæge Kristian Bakke Arvesen, næste revidering: april 2026. (version 2)